

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С ОРГАНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ИНВАЛИДОВ И НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ

Бейбалаева Тангюль Загировна

Ассистент, ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ
tanguel23@gmail.com

CLINICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS OF WORKING AGE WITH ORGANIC MENTAL DISORDERS, WHO HAVE THE STATUS OF DISABLED PEOPLE AND ARE ON INPATIENT TREATMENT

T. Beybalaeva

Summary. This article presents the results of studying the level, dynamics and causes of disability in hospitalized patients of working age with organic mental disorders. Cases of specialized hospitalization of patients of working age (men 18–59 years old, women 18–54 years old) with an established diagnosis of an organic mental disorder (subcategories ICD-10 F04-F09) and the status of a disabled person were studied.

Keywords: organic mental disorders, disability, working age, hospitalization.

Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения уровня, динамики и причин инвалидизации госпитализированных пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами. Были изучены случаи профильной госпитализации пациентов трудоспособного возраста (мужчин 18–59 лет, женщин 18–54 года), имеющих установленный диагноз органического психического расстройства (подрубрики МКБ-10 F04-F09) и статус инвалида.

Ключевые слова: органические психические расстройства, инвалидность, трудоспособный возраст, госпитализация.

Инвалидность трудоспособных контингентов является одним из основных показателей состояния здоровья населения [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, по частоте инвалидизации психические заболевания являются третьей по распространенности причиной стойкой утраты трудоспособности [2].

Органические психические расстройства играют существенную роль в процессе увеличения случаев инвалидизации вследствие психических расстройств, что обусловлено их значительной распространенностью в популяции, хроническим, часто прогрессивным течением, стойкостью, появлением новых экзогенных

факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья населения [3].

В соответствии с программой ВОЗ по охране психического здоровья деятельность по оказанию психиатрической помощи должна быть адаптированной к потребностям отдельных лиц и различных групп населения. Инвалиды вследствие органических психических расстройств нуждаются в решении проблем профилактики инвалидности, в связи с чем для разработки персонализированных программ медико-социальной реабилитации необходимо изучение медико-социальной характеристики инвалидности в разных группах больных [2,4,5].

Таблица 1. Численность и доля пациентов с группами инвалидности среди госпитализированных мужчин и женщин 18 лет и старше с органическими психическими расстройствами в 2000–2019 гг. в Республике Татарстан (в абс.ч. и%)

Годы	Инвалидность 1 гр.		Инвалидность 2 гр.		Инвалидность 3 гр.		Пациентов с инвалидностью всего	Доля пациентов с инвалидностью среди всех госпитализированных	
	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%		Абс.	%
Оба пола									
2000–2019	599	3,5	16006	87,5	1562	9,0	17267		54,6
2000–2009	348	3,5	8953	91,3	508	5,2	9809		53,2
2010–2019	251	3,4	6153	82,5	1054	14,1	7458		56,5
Мужчины									
2000–2019	366	3,4	9157	86,1	1103	10,5	10626		49,1
2000–2009	192	3,3	5197	90,4	362	6,3	5751		45,3
2010–2019	174	3,6	3960	81,2	741	15,2	4875		54,4
Женщины									
2000–2019	233	3,5	5949	89,6	459	6,9	6641		66,6
2000–2009	156	3,8	3756	92,5	146	3,7	4058		70,7
2010–2019	77	3,0	2193	84,9	313	12,1	2583		61,0

Таблица 2. Средний возраст госпитализированных пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами с группами инвалидности в 2000–2019 гг. в Республике Татарстан (в абс.ч. и%)

Группа инвалидности	Средний возраст (X)	Среднеквадратическое отклонение (σ)	Средняя ошибка средней величины (m)
1 группа	44,1	10,0	0,4
2 группа	42,0	10,4	0,08
3 группа	40,9	11,0	0,28

Научная новизна

В ходе выполнения работы был применён комплексный подход к выявлению особенностей инвалидизации пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами. Результаты исследования позволят разработать мероприятия по профилактике инвалидизации у пациентов трудоспособного возраста.

Цель исследования

Изучить уровни, динамику и причины инвалидизации госпитализированных пациентов трудоспособного

возраста с органическими психическими расстройствами.

Объект исследования: госпитализированные пациенты трудоспособного возраста (мужчины 18–59 лет, женщины 18–54 года), имеющие установленный диагноз органического психического расстройства (подрубрики МКБ-10 F04-F09) и статус инвалида.

Сплошным методом за 2000–2019 гг. были проанализированы случаи профильной госпитализации в Республике Татарстан пациентов трудоспособного возраста 18 лет и старше (мужчин 18–59 лет; женщин 18–54 лет) с органическими психическими расстрой-

Таблица 3. Структура госпитализированной заболеваемости пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами с инвалидностью 1–3 гр. в 2000–2019 гг. в Республике Татарстан (%)

Ранг	Инв. 1 гр.		Инв. 2 гр.		Инв. 3 гр.	
	Шифр по МКБ-Х	%	Шифр по МКБ-Х	%	Шифр по МКБ-Х	%
1.	F07.08	20,5	F07.08	24,8	F07.08	38,8
2.	F07.02	15,7	F06.28	9,6	F07.02	8,7
3.	F06.818	8,8	F07.02	8,4	F07.88	7,6
4.	F07.88	7,8	F07.88	7,6	F06.28	6,7
5.	F06.28	4,7	F06.819	4,5	F06.378	3,3
6.	F06.812	4,5	F06.818	4,2	F06.828	2,8
7.	F07.82	3,5	F06.29	4,2	F07.00	2,6
8.	F07.09	3,0	F07.09	2,8	F07.09	1,9
9.	F06.819	2,7	F06.828	2,0	F06.29	1,7
10.	F06.29	2,2	F06.812	1,8	F06.818	1,7
	Прочие	26,5	Прочие	30,1	Прочие	24,3
Итого		100		100		100

ствами (МКБ-Х, класс V — Психические расстройства и расстройства поведения; блок F00–F09– Органические, включая симптоматические, психические расстройства), имеющих инвалидность 1–3 групп.

За два десятилетия общее число госпитализаций изучаемого контингента составило 17267. Их доля среди всех госпитализированных пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами оказалась равной 54,6%, с различием у мужчин (49,1%) и женщин (66,6%) соответственно (табл. 1).

Средний возраст госпитализированных пациентов с инвалидностью оказался довольно молодым: у инвалидов 3 группы он составил $40,9 \pm 0,2$; 2 группы — $42,0 \pm 0,08$; 1 группы — $44,1 \pm 0,4$ лет, причем возраст инвалидов 1 группы оказался существенно выше такового по сравнению с 3 группой (табл. 2).

Большинство пациентов с инвалидностью проживали в городской местности (66,5%). Доля таковых преобладала среди инвалидов 1 гр. (77,5%), среди инвалидов 2 гр. и 3 гр. она составила 65,7% и 69,8% соответственно.

Наиболее распространенными формами органических психических расстройств среди изучаемого контингента явились заболевания из рубрик МКБ-10 F 06 и F07: F07.08 Расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями, F07.02 Расстройство личности в связи с эпилепсией, F06.28 Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи со смешанными заболеваниями (табл. 3).

ВЫВОДЫ

Пациенты, имеющие статус инвалидов, составили более половины среди всех госпитализированных пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами. Наиболее распространенными причинами инвалидности среди пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами, находящихся на стационарном лечении, явились заболевания из рубрик МКБ-10 F 06 и F07, что определяет данные заболевания как приоритетные для дальнейшего изучения с целью выявления предикторов инвалидизации.

Полученные данные подчеркивают актуальность вопроса инвалидности вследствие органических психических расстройств и будут полезны для прогноза, планирования и организации специализированной психиатрической и медико-социальной помощи экономически активному населению региона, системы реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профилактики стойкой утраты трудоспособности у данной категории пациентов.

Таким образом, в ходе выполнения работы был применён комплексный подход к выявлению особенностей инвалидизации пациентов трудоспособного возраста с органическими психическими расстройствами. Результаты исследования позволят разработать мероприятия по профилактике инвалидизации у пациентов трудоспособного возраста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бейбалаева Т.З., Яхин К.К. Актуальные вопросы инвалидности трудоспособного населения вследствие психических заболеваний // Неврологический вестник. — 2020. — № 3. — С. 63–69.
2. Трущелёв С.А., Кекелидзе З.И., Демчева Н.К. Инвалидность вследствие психических расстройств в Российской Федерации // Российский психиатрический журнал. 2019. No 3. С. 4–10. DOI: 10.24411/1560–957X-2019–11922
3. Амиров Н.Х., Яхин К.К. Физические факторы окружающей среды и психическое здоровье. Казань: Казанский гос. мед. ун-т. 2007; 193 с.
4. Демчева Н.К. Распространенность психических расстройств в РФ в 1991–2012 гг. // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2014. No 5. С. 3–12.
5. Доклад ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Состояние и динамика инвалидности взрослого населения Российской Федерации», 2019 г.

© Бейбалаева Тангюль Загировна (tanguel23@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Казанский государственный медицинский университет